

# D O R I A N A

Supplemento agli

LI DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE "G. DORIA,,

G E N O V A

Vol. IV - N. 188

20 - IV - 1970

RES LIGUSTICAE

CLX

ELENA CALONE BOTTINO

## CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DEL MACROPLANKTON DEL MAR LIGURE (SIFONOFORI, MEDUSE, CTENOFORI)

Nella presente nota sono enumerate 26 specie di Cnidari e 5 specie di Ctenofori che a tutt'oggi risultano essere presenti nel Mar Ligure. Esse vengono citate in base ai dati della letteratura, al materiale che ho esaminato nel Museo di Storia Naturale di Genova e ad alcuni appunti fornitimi dal Prof. E. Tortonese e relativi ad alcune sue osservazioni. Quanto viene riferito è naturalmente ben lungi dal costituire un completo quadro faunistico, ma può riuscire utile in relazione a future indagini.

C N I D A R I A

ANTHOMEDUSAE

BRIAN (1949) riferì di avere raccolto Idromeduse nel porto di Genova (28-29.IX.1942) e nelle sue vicinanze (San Giuliano, 13.IX.1942). Esse erano rare nella prima località, più frequenti nella seconda. Non furono determinate. Oltre alle Antomeduse, erano probabilmente rappresentati anche i quattro Ordini di Meduse successivi.

**Steenstrupia nutans** (M. Sars)

HAECKEL, 1879: Rapallo (*S. lineata*).

**Neoturris pileata** (Forsk.)

VÉRANY, 1846: M. Ligure (*Dianeia pileata*).



**Velella velella (L.)**

VÉRANY, 1846: Mar Ligure (*V. limbosa*).

Museo: Albisola (15.V.1924), Genova (19.V.1924). A Levanto compare in gran numero, ma irregolarmente (TORTONESE-FARAGGIANA, 1937). Questo caratteristico Cnidario, al pari dell'affine *Porpita*, fu tradizionalmente ascrivito ai Sifonofori, ma le più recenti ricerche ne hanno dimostrata l'appartenenza alle Antomeduse, cioè agli Idroidi (Fam. Pteronematidae). Si vedano in proposito: PICARD (1955), HARDY (1956), TREGOUBOFF (1957).

**Porpita porpita (L.)**

VERANY, 1846: Genova (*P. glandifera*).

CARUS, 1885 (*P. mediterranea*).

Museo: Genova-Quarto (1º.IX.1969).

A Levanto fu osservata insieme alle Velelle.

## LEPTOMEDUSAE

**Laodicea undulata (Forb. Goods.)**

HAECKEL, 1879: La Spezia (*L. cruciata*).

**Mitrocoma annae Haeck.**

ROSSI, 1950: Rapallo. È caratteristica del Mediterraneo.

**Obelia, sp.**

Nè all'esemplare di Quarto figurato da ISSEL (1918, p. 136, f. 30 A), nè a quelli veduti a Levanto (VIII.1937) è possibile assegnare un nome specifico. Ciò si accorda con quanto fecero osservare tutti gli AA. che, riferendosi agli individui medusoidi, citarono semplicemente *Obelia*, sp. nelle loro opere.

**Tima lucullana (D. Ch.)**

VÉRANY, 1846 (*Dianeia lucullea*). Anche questa specie è nota unicamente nel Mediterraneo.





**Aequorea aequorea** (Forsk.)

VÉRANY, 1846: Genova (*Ae. forskalea* e *Ae. rissoana*).

HAECKEL, 1879: Porto Venere (*Polycanna rissoana*).

Il primo di questi AA. elenca pure *Ae. mesonema* Pér., che è sinonima di *Ae. pensilis* (Esch.). La presenza di questa specie appare però dubbia; KRAMP (1961) non cita alcuna località mediterranea.

## LIMNOMEDUSAE

**Olindias phosphorica** (D. Ch.)

VÉRANY, 1846: Genova (*Oceania ph.*).

Museo: S. Margherita ligure, praterie di posidonie (25.VII.1959).

## TRACHYMEDUSAE

**Geryonia proboscidalis** (Forsk.)

VÉRANY, 1846 (*Dianeia pr.*).

HAECKEL, 1879: Rapallo (*Carmarina hastata*).

CARUS, 1885.

Osservata a Levanto (VIII.1937).

**Liriope tetraphylla** (Cham. Eis.)

HAECKEL, 1879: Genova (*L. ligurina*).

CARUS, 1885: Genova (*L. eurybia*).

ROSSI, 1950: Rapallo (*L. eurybia*).

**Aglaura hemistoma** Pér. Les.

ISSEL, 1918: Genova-Quarto (p. 136, f. 30 B).

**Rhopalonema velatum** Geg.

ROSSI, 1950: Rapallo.

Osservata a Levanto (VIII.1937).

## NARCOMEDUSAE

**Solmundella bitentaculata** (Quoy-Gaim.)

ROSSI, 1950: Rapallo. (*S. mediterranea*).

Di questa specie, che è cosmopolita, TREGOUBOFF (1957) ammette una « var. *mediterranea* », che è molto comune in superficie durante la stagione fredda.

## SIPHONOPHORA

**Physalia physalis** (L.)

Museo: Camogli, VI.1901.

**Apolemia uvaria** (Lam.)

VÉRANY, 1846: Genova (*Stephanomia u.*).

CARUS, 1885 (*id.*).

**Hippopodius hippopus** (Forsk.)

VÉRANY, 1846: Genova (*H. luteus*).

CARUS, 1885.

**Muggiaea kochi** (Will.)

Osservata a Levanto (VIII.1937).

**Chelophyes appendiculata** (Esch.)

ISSEL, 1918, p. 137, f. 31 (*Diphyes*, sp.).

VÉRANY (1846) cita una imprecisabile *Diphya* (sic) Bory Blainv.

## CUBOMEDUSAE

**Carybdea marsupialis** (L.)

ROSSI, 1950: Rapallo.

Osservata a Celle (VIII.1931), catturata con le reti a strascico.



## C O R O N A T A E

**Peryphylla peryphylla** (Pér. Les.)

ROSSI, 1958: al largo della Riviera di Levante, tra Portofino e Punta Mesco, m 500.

Museo: Riviera di Levante, m 500, 16.XI.1957 (Crociera della « Calypso »).

## S E M A E O S T O M E A E

**Pelagia noctiluca** (Forsk.)

VÉRANY, 1846: Genova (*P. panopyra*).

CARUS, 1885.

Museo: Bogliasco, 19.VI.1957.

Durante le estati 1957 e 1958 comparve in gran numero; molte furono vedute presso il promontorio di Portofino, anche vicino alla riva.

**Aurelia aurita** (L.)

VÉRANY, 1846: Genova. Questo A. menziona pure *A. crucigera* Lam.; si tratta probabilmente di *A. cruciata* V. Ben., identica a *A. aurita*. Un individuo fu osservato presso Punta Chiappa (IX.1958); nel mar Ligure risulta rara.

## R H I Z O S T O M E A E

**Cotylorhiza tuberculata** (Macri)

VÉRANY, 1846: Genova (*Cassiopaea borbonica*).

HAECKEL, 1879: Rapallo.

CARUS, 1885: Genova.

ROSSI, 1950: Rapallo.

Questa comune Medusa, in alcune estati compare con abbondanza eccezionale. A Levanto (VIII.1937) TORTONESE e FARAGGIANA ne videro molte, soprattutto giovani; sia i giovani che gli adulti non erano accompagnati da pesciolini. Questi erano invece numerosi presso grosse Cotilorize osservate a Camogli.

**Rhizostoma pulmo (L.)**

VÉRANY, 1846: Genova (*Rh. Aldrovandi*).

CARUS, 1885: Genova (*Pilema pulmo*).

ROSSI, 1950: Portofino.

Museo: Sori (VII.1956), S. Fruttuoso (VII.1957), Genova (V.1969). A Levanto è comune in estate, accompagnata da sciame di giovani tracuri (TORTONESE-FARAGGIANA, 1937).

## CTENOPHORA

**Callianira bialata (D. Ch.)**

VÉRANY, 1846: Genova. Cita pure *C. diploptera* Pér.

CARUS, 1885.

**Bolinopsis vitrea (Ag.)**

Osservata in gran numero a Punta Chiappa (VIII.1957) e presso Monterosso (estate 1960).

**Leucothea multicornis (Esch.)**

VÉRANY, 1846: Genova (*Eucharis m.*).

CARUS, 1885 (*Eucharis m.*).

**Cestus veneris Les.**

VÉRANY, 1846: Genova.

CARUS, 1885.

**Beroe cucumis (Fabr.)**

VÉRANY, 1846: Genova (*B. ovatus*).

A Levanto si sono riscontrate vere invasioni presso il litorale, soprattutto a fine settembre. Questo Ctenoforo fu osservato in aprile (1965) a Punta Chiappa.



## BIBLIOGRAFIA

- BRIAN A., 1949 - Osservazioni sul plancton del Porto di Genova raccolto nel Settembre 1942 - *Ann. Mus. St. Nat. Genova*, **63**: 52-64.
- CARUS V., 1885 - Prodrömus Faunae Mediterraneae I. Stuttgart.
- FEDELE M., 1940 - Ctenofori mediterranei - *Boll. Zool.*, **XI**, 5-6: 153-174.
- HAECKEL E., 1879 - Das System der Medusen.
- HARDY A.C., 1956 - The Open Sea - London.
- ISSEL R., 1918 - Biologia marina - Milano.
- KRAMP P.L., 1961 - Synopsis of the Medusae of the World - *Journ. Mar. Biol. Ass.*, **40**: 1-469.
- PICARD J., 1955 - Les Hydroides Pteronematidae, origine des « Siphonophores » Chondrophoridae - *Bull. Inst. Océan. Monaco*, **1059**.
- ROSSI L., 1950 - Celenterati del Golfo di Rapallo (Riviera Ligure) - *Boll. Ist. Mus. Zool. Univ. Torino*, **II**, 4: 193-235.
- — 1958 - Contributo allo studio della fauna di profondità vivente presso la Riviera Ligure di Levante - *Doriana*, **II**, n. 92.
- RUSSELL F.E., 1953 - The Medusae of the British Isles - Cambridge.
- TORTONESE E. e FARAGGIANA R., 1937 - Osservazioni biologiche nell'insenatura di Levante (Riviera Ligure) - *Natura*, **28**: 50-72.
- TOTTON A.K., 1965 - A Synopsis of the Siphonophora - Londra, Brit. Mus.
- TREGOUBOFF G. e ROSE M., 1957 - Manuel de Planctonologie méditerranéenne - I-II. Parigi.
- VERANY J.B., 1846 - Zoofiti (Polipi, Acalefi) - Descr. Genova e Genovesato. Genova: 83-85.

## RIASSUNTO

Viene presentato un elenco di 26 specie di Cnidari (Sifonofori, Meduse) e 5 specie di Ctenofori viventi nel mar Ligure.

## SUMMARY

A list is given of 26 species of Cnidaria (Siphonophora, Medusae) and 5 species of Ctenophora living in the Ligurian sea.